

APRONAX



Ponle un alto al dolor Fuerte



- Analgésico, antipirético y antiinflamatorio. En procesos inflamatorios y dolorosos de diversa etiología. **APRONAX®**, solo o asociado, proporciona disminución rápida y efectiva de la inflamación y el dolor.
- **APRONAX®**, el AINE con seguridad integral.
- Mayor penetración sinovial que ejerce poder antiinflamatorio en las articulaciones.

*Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud

APRONAX



Potente y eficaz para el dolor causado por la inflamación



Analgésico, antipirético, antiinflamatorio



Tabletas o cápsulas de gelatina blanda



DOLOR FUERTE DE:

CUELLO
GARGANTA
ESPALDA
MUSCULAR



L.CO.MKT.CC.07.2020.3231

APRONAX

NAPROXENO SÓDICO



APRONAX® 275 mg. INVIMA 2015 M-004602-R3. Cada tableta recubierta contiene: 275 mg de Naproxeno sódico. Indicaciones: Analgésico, antipirético. **APRONAX® TABLETAS 550 mg.** INVIMA 2012 M-012970-R2. Cada tableta recubierta contiene: 550 mg de Naproxeno sódico. Indicaciones: Analgésico, antiinflamatorio no esteroide. **APRONAX® LIQUID GELS.** INVIMA 2013 M-0014208. Cada cápsula blanda de gelatina contiene: 275 mg de naproxeno sódico. Indicaciones: Analgésico, antipirético. **Contraindicaciones:** Hipersensibilidad al principio activo o a sus excipientes. Reacción alérgica al ácido acetilsalicílico o a otros AINEs. Asma, broncoespasmo, rinitis aguda, pólipos nasales y edema angioneurótico. Desórdenes de la coagulación. Enfermedad cardiovascular. Úlcera péptica, sangrado gastrointestinal y antecedentes de enfermedad ácido péptica. Disfunción hepática severa. No administrar durante el embarazo en especial durante el tercer trimestre y la lactancia. Insuficiencia renal grave (depuración de creatinina <30 ml / min.). Se recomienda iniciar tratamiento con las dosis más bajas. El uso concomitante de Naproxeno con ácido acetilsalicílico (ASA) incluyendo inhibidores selectivos de COX-2 debe evitarse. El uso concomitante con ASA incrementa el riesgo de úlcera gastrointestinal y sus complicaciones. **Precauciones y Advertencias:** En pacientes ancianos utilizar la dosis mínima. No se recomienda el uso de este producto en niños menores de 16 años. Evítese tomar este producto simultáneamente con alcohol. Puede aumentar los efectos anticoagulantes de la cumarina. No emplee este medicamento por más de tres (3) días para la fiebre y por más de diez (10) días para el dolor. Si los síntomas persisten o empeoran, consulte a su médico.